

Вакцины для подростков

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



Менингококковая конъюгатная вакцина (MCV, MenB)	Туровые вакцины для подростков	Столбняк, дифтерия, коклюш (АКДС)	Вирус папилломы человека (ВПЧ)
<p>Менингококковые вакцины защитят вас от менингита, который поражает головной и спинной мозг.</p> <p>Если вы заболите менингитом, он может привести к повреждению мозга, тяжелой инвалидности или смерти.</p> <p>Наиболее частые симптомы включают лихорадку, сыпь, головную боль и ригидность затылочных мышц.</p> <p>Инфекция передается при близком контакте с носителем инфекции, например, при кашле, поцелуе и употреблении общей еды и напитков. Заболевание быстро распространяется.</p> <p>Первая доза MCV должна вводиться в 11-12 лет, а вторая – в 16 лет. MenB вводится в 16-18 лет несколькими дозами. Если вы не были вакцинированы до получения диплома, обсудите со своим врачом, как это можно наверстать.</p>	<p>Многие вакцины вводятся в детском возрасте для обеспечения пожизненной защиты от заболеваний.</p> <p>Если вы не получали вакцины, перечисленные ниже, еще не поздно!</p> <p>3 дозы вакцины от гепатита В (Нер В)</p> <p>2 дозы вакцины от гепатита А (Нер А)</p> <p>2 дозы вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК)</p> <p>2 дозы вакцины от ветряной оспы</p> <p>Минимум 3 дозы вакцины от полиомиелита (ИПВ или ОПВ)</p> <p>Ежегодная вакцинация от гриппа</p> <p>Эти вакцины важны, особенно если вы планируете путешествия. Для полной защиты необходимо введение всех доз.</p>	<p>Вакцина АКДС защищает вас от коклюша, дифтерии и столбняка.</p> <p>Столбняк вызывает болезненное сокращение мышц и является очень опасным заболеванием. Его возбудитель обитает в почве и попадает в организм через порез или рану.</p> <p>Дифтерия может привести к удушью или параличу. Она передается при кашле или чихании.</p> <p>Коклюш может вызвать сильный кашель и удушье, затрудняя дыхание или прием пищи. Он передается при кашле, чихании или близком контакте с носителем инфекции.</p> <p>Вакцина АКДС обычно вводится в возрасте 11-12 лет. Однако любому невакцинированному человеку необходимо сделать прививку.</p>	<p>Вакцина от ВПЧ предотвращает развитие рака шейки матки у женщин и остроконечных кондилом у мужчин и женщин. Также она может защитить вас от некоторых других видов рака.*</p> <p>ВПЧ – это распространенная инфекция, передаваемая при кожном контакте во время половой близости. Даже при отсутствии полового акта вы можете инфицироваться ВПЧ. ВПЧ-инфекция часто протекает бессимптомно, так что вы можете быть носителем и не знать об этом.</p> <p>Лучший возраст для вакцинации от ВПЧ – 11-12 лет, задолго до начала половой жизни. Однако, если вы пропустили время вакцинации, вам следует сделать прививку до 26 лет.</p> <p>Данная вакцина очень эффективна против нескольких типов ВПЧ и действует лучше всего, если вы получили все три дозы до начала половой жизни.</p>